ZOOPAN®
SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL

EXPERIENCE
AND INOVATION

SINCE 1980

CATÁLOGO

PREVENTIVOS / SUPLEMENTOS / ALIMENTOS
ESQUEMAS DE TRATAMENTO

A QUALIDADE E A EFICÁCIA DE SEMPRE
COM NOVOS PRODUTOS

AS SUAS AVES MERECEM O MELHOR!

AO ESCOLHER OS PRODUTOS ZOOPAN, ESTARÁ A UTILIZAR QUALIDADE CERTIFICADA. Auditorias constantes da DGAV, Comissão Europeia e outras entidades atestam a nossa qualidade.

A ZOOPAN orgulha-se de ser uma PME portuguesa fabricante de medicamentos e suplementos com notório prestigio internacional, que tem participado nos maiores certames internacionais (Europa, Extremo Oriente, Médio Oriente e África) , onde tem ombreado com as grandes multinacionais do sector da produção e saúde animal.

Por tal facto incontestável e pela qualidade que evidencia e comprova com certificados, é hoje uma empresa que exporta as suas marcas, e outras marcas a pedido, para diversos países dos diversos continentes.

ÍNDICE

1 Esquemas de tratamento - Canaricultura

2 Informação técnica

3 Psitacideos e outras aves ornamentais

4 Suplementos

13 Medicamentos de uso veterinário (não sujeitos a receita médico-veterinária)

15 Medicamentos de uso veterinário (sujeitos a receita médico-veterinária)

Rua da Liberdade, n.º 77
2050-023 Aveiras de Baixo
Portugal

T. +351 263 470 160/162
F. +351 263 470 169
E. geral@zoopan.com

CERTIFICATIONS:
EU Good Manufacturing practices GMP
NP EN ISO: 9001:2008 GMP
HACCP Codex Alimentarius

www.zoopan.com

ZOOPAN®
SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL



CANARICULTURA

Esquemas de Tratamento

ÉPOCA DE REPRODUÇÃO

Do bom estado de saúde e do bom estado físico depende uma boa fertilidade e um maior êxito com as crias.

Daí considerarmos importante que, além de uma boa alimentação, deveremos reforçar as defesas do organismo das aves, prevenir avitaminoses, reforçar a flora intestinal, proceder à desparasitação interna contra os vermes do aparelho digestivo, prevenir e curar doenças. Assim, nos meses de Dezembro e Janeiro, será importante seguir o seguinte esquema de preparação e prevenção:

1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana
• Proceder a uma limpeza e desinfecção de todo o material com BIOCID-S, seguido de VIROCID® • Administrar CARVACTYME PRO BIOS® na água, durante 4 a 5 dias, e juntar na mesma água o VITAMINO L. • Administrar durante 3 dias o OPTI-PARASITAS PRO BIOS®, juntando na mesma água o COMPLEXO B.	• OPTI-TYLOS PRO BIOS® ou OPTI-RESP PRO BIOS® durante 3 dias. • VITADEC+K durante 2 dias. • AVISSTRESS durante 2 dias. **Colocar FOSCAVIT ORNI num recipiente à descrição, durante toda a semana, onde a ave se irá suplementa sempre que necessite.**	Continuar com o FOSCAVIT ORNI num recipiente à descrição durante toda a semana e administrar o VITAMINO L durante 2 dias.	Durante os 3 primeiros dias da semana, juntar à água de bebida o VITADEC e depois o PRO-HEPATIC, durante 4 dias seguidos.

PREPARAÇÃO PARA A POSTURA / POSTURA

Para que se efectue o acasalamento (em finais de Janeiro e Fevereiro) será necessário vigiar atentamente os casais para se assegurar da compatibilidade entre eles, e assim, evitar brigas perigosas. Alguns casais demoram mais tempo a aceitarem-se. Após o acasalamento deverá proceder-se ao seguinte esquema de tratamento:

1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana
• CARVACTYME PRO BIOS® + VITAMINO L durante 4 dias; • PRO-HEPATIC durante 2 dias; • VITADEC+K durante 1 dia.	• PRO-HEPATIC durante 2 dias; • COMPLEXO B durante 1 dia; • CARVACTYME PRO BIOS® durante 4 dias.	• VITAMINO L durante 2 dias; • CARVACTYME PRO BIOS® durante 4 dias.	• VITADEC+K durante 3 dias; • VITAMINO L durante 1 dia;

OBS: Deverá existir um recipiente com FOSCAVIT ORNI (em pó) sempre a disposição das aves, para que estas, sempre que necessitem , se suplementem dos minerais indispensáveis ao metabolismo, ossificação, formação da casca do ovo, à prevenção das carências vitamínicas e minerais e à saúde em geral.

CRIAS - DESENVOLVIMENTO SAÚDAVEL

As crias são bastante sensíveis à invasão de bactérias que provocam graves distúrbios intestinais e mortalidade. Será importante preparar o alimento apropriado com antecedência, tendo em atenção que a eclosão dos ovos é normalmente ao 13º dia. O alimento, a fornecer as crias, além de ter que ser rigorosamente isento de bactérias, fungos e bolores (ler cuidados a ter em conselhos úteis sobre a alimentação/germinação de sementes), deverá incluir o **CARVACTYME PRO BIOS®** (durante 10 dias seguidos) para prevenir infeções intestinais e, o **BIO-SAC WS**, pois este produto, além de repovoar o intestino com a flora saprófita útil e indispensável, promove a síntese do complexo B, fornece enzimas indispensáveis ao aproveitamento do alimento e vai ainda evitar um grande número de problemas digestivos provocados por colibaciloses e salmoneloses e promover um desenvolvimento harmonioso e saudável das aves. No caso de surgir mortalidade nas crias terá que recorrer a uma terapêutica adequada. Neste caso consulte o seu médico veterinário ou os nossos serviços técnicos, pois poderá necessitar da utilização dos nossos produtos à base de antibióticos.

Além de uma boa alimentação e prevenção de distúrbios intestinais, será necessário, semanalmente e em dias alternados, juntar à água de bebida o **VITAMINO L** que, além de reforçar a alimentação em aminoácidos, previne avitaminoses, reforça as defesas do organismo e melhora o metabolismo

SEPARAÇÃO DAS CRIAS:

A separação das crias, se houver um desenvolvimento normal, tem lugar entre a 4ª e 5ª semana. Cuidados a ter em conta nesta fase:

ALIMENTAÇÃO:

Convém, se não dispuser de alimento apropriado, continuar a dar sementes germinadas durante algum tempo, juntando a estas, sementes sem germinar, em quantidades progressivamente maiores, para que se habituem e aprendam a consumir o novo tipo de alimento.

Deverá continuar a juntar o BIO-SAC WS, pois este produto continua a ser importante nesta fase e 2 a 3 dias por semana o CARVACTIM na água.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PREVENÇÃO DA DOENÇA

Nesta fase, em que as aves continuam bastante sensíveis às doenças, em especial às doenças respiratórias e digestivas, a prevenção é importante e indispensável. Assim, deverá seguir-se o seguinte esquema:

1ª Semana	Semanas seguintes
CARVACTYME PRO BIO® + VITADEC + K durante 4 dias.	4 dias de OPTI-RESP PRO BIOS® + VITAMINO L, seguido de 1 dias de água limpa e de 2 dias de PRO-HEPATIC.

MANUTENÇÃO DURANTE O PERÍODO DE REPOUSO

Fora das épocas especiais referidas anteriormente, as aves estão em repouso e não sofrem outros transtornos além do stress provocado pelas alterações bruscas de temperatura, ruídos excessivos e outros distúrbios esporádicos. Além de uma alimentação cuidada e limpa, recomendamos o seguinte esquema de prevenção:

Semanalmente
1 dia de VITADEC+K, 1 dia de VITAMINO L após 2 dias de intervalo e 1 dia com PRO-HEPATIC.

EXPOSIÇÕES

Uma exposição constitui uma das situações de maior stress para as aves. As situações criadas pelas exposições (transportes, barulhos, alterações do ambiente, etc) provocam sempre uma baixa nas defesas do organismo que fica muito receptivo a doenças. No final da exposição, no regresso ao seu ambiente habitual é imperativo fazer o seguinte tratamento:

CARVACTYME PRO BIOS® durante 3 dias seguidos, repousar 1 dia, seguido de 3 dias de AVISSTRESS.

Prosseguir de seguida com o esquema de manutenção.

MUDA

INICIO DA MUDA:

É das fases mais críticas da vida das aves, não devendo ser perturbadas por qualquer enfermidade nesta fase. Como tal, recomenda-se que proceda ao seguinte esquema logo no inicio da muda:

Desparasite as aves	Diminua as enfermidades infecciosas
OPTI-PARASITAS PRO BIOS® ou Medicamento veterinário adequado	• OPTI-RESP PRO BIOS® ou OPTI-TYLOS PRO BIOS® durante 3 a 5 dias: Problemas respiratórias. • CARVACTYME PRO BIOS® durante 10 dias seguidos: Problemas digestivos.

NOTA: Consulte o seu veterinário. Será ele o mais capacitado para o aconselhar nas enfermidades acima referidas e noutras que surjam, depois da utilização dos produtos indicados.

DURANTE A MUDA:

Seguir o esquema de tratamento abaixo:

Produtos a usar	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.	Dom.
OPTI-MUDA		X		X		X	X
BIO-SAC + Dextrapropil	X		X		X		
VITAMINO L	X		X		X		X
CARVAC-TYME		X		X		X	

CONSELHOS ÚTEIS

QUARENTENA:

Nunca junte uma ave que adquiriu sem fazer uma quarentena de acordo com o seguinte esquema preventivo: 3 dias de CARVACTYME PRO BIOS®, 2 dias de repouso, seguido de 3 dias de AVISSTRESS® e 5 dias de OPTI-RESP PRO BIOS®.

HIGIENE:

O habitat das aves é muito importante pelo que deverá proceder periodicamente à limpeza e lavagem dos bebedouros, comedouros, instalações com o BIOCID-S, e proceder de seguida à desinfecção com o VIROCID®.

ALIMENTAÇÃO/GERMINAÇÃO DAS SEMENTES:

A água a utilizar na germinação das sementes deverá ser potável.

Juntar a cada kg de sementes uma colher de chá de ALIPROCT, protector contra o desenvolvimento de bactérias patogénicas, fungos e bolores que são responsáveis pelos problemas digestivos das aves.

A alimentação contaminada é a primeira responsável pelos problemas digestivos que afectam as aves. Deverá, portanto, ser objecto de cuidados, evitando ser conspurcada: Não deve ser manipulada com as mãos (veículo frequente de bactérias), devendo o utensílio usado estar sempre bem limpo e desinfectado.O abuso de sementes oleaginosas (girassol, nabo, amendoim, cânhamo, linhaça, entre outras), provocam sobrecargas hepáticas (fígado gordo) doença de solução difícil. Sendo estas sementes as mais apetecidas pelas aves, deverão fazer parte de uma mistura em que as oleaginosas não deverão ultrapassar cerca de 18%. A restante parte da mistura de sementes pode ser constituída por: alpista, aveia descascada, painço, leguminosas e outros cereais, e sementes em que a componente energética seja essencialmente constituída por amidos e não por gorduras.

PSITACIDEOS E OUTRAS AVES ORNAMENTAIS

OBSERVAÇÕES

Acontece com muita frequência pensar-se, erradamente, que a semente de girassol é o melhor alimento para os papagaios e outros psitacídeos de grande e pequeno porte. A semente de girassol é realmente um alimento altamente energético. No entanto, o seu valor energético provém de um alto teor em gordura (óleo) e, por isso, quando dado como único alimento ou mais de 20% do total da alimentação, provoca uma sobrecarga hepática (fígado gordo) o que acarreta problemas na saúde: diarreias, hepato-enterites, deplumagem, pica, avitaminoses, perturbações no metabolismo, mau aproveitamento dos nutrientes e depauperamento das defesas do organismo que acarretam outras doenças.

Uma alimentação sadia terá na constituição, por exemplo: 15 a 20% de sementes de girassol, frutas, legumes (cenouras e outros) feijão, milho, ervilhas, grão de bico, alpista e outros cereais.

Aos grandes psitacídeos pode dar-se também alguma carne cozida, massa alimentícia, entre outros.

PERÍODOS DE ACASALAMENTO, POSTURA, CRIAS, EXPOSIÇÕES

RECOMENDAÇÕES:

Podem ser seguidos esquemas muito idênticos aos descritos para canários, no que diz respeito aos períodos de reprodução (acasalamento, postura e criação), exposições e demais recomendações quanto a cuidados com a alimentação e higiene do habitat.

MANUTENÇÃO

Desparasitar de 6 em 6 meses ou, pelo menos, 1 vez por ano com OPTI-PARASITAS PRO BIOS® na água de bebida.

Em dias alternados e uma vez por semana: VITADEC+K 1 dia; VITAMINO L 1 dia; PRO-HEPATIC 1 dia.

SUPLEMENTOS

COMPLEXO B

COMPOSIÇÃO POR LT

Vitamina B1	1 800 mg
Vitamina B2	4 000 mg
Vitamina B6	2 200 mg
Vitamina B12	10 mg
Vitamina PP	15 gr
Vitamina K3	2 500 mg
Excipiente q.b.p.	

INDICAÇÕES

Indicado em situações de suplementação vitamínica em caso de carências vitamínicas do grupo B nas aves; desintoxicação; astenia; prevenção do stress; em períodos de crescimento intensivo ou produção de ovos; reconstituição da flora intestinal; corrector nutricional em desequilíbrios digestivos, após infecções e tratamento com anti-infecciosos, sulfamidas , ou desparasitantes. Indicado também na melhoria da fertilidade, preparação para a muda, concursos, treinos.

DOSAGENS

1 ml (25 gotas) por litro de água de bebida durante 3 a 5 dias.

APRESENTAÇÃO

50 e 100 ml

VITAMINO L

TEORES ANALÍTICOS

Proteína bruta	6,7%
Cinzas totais	1,3%
Lisina	0,7%
Metionina	0,7%

ADITIVOS POR LT

Vitamina A	10.000.000 UI
Vitamina D3	2.000.000 UI
Vitamina E	10.000 mg
Vitamina B1	1.700 mg
Vitamina B2	1.800 mg
Vitamina B3	2.500 mg
Cloreto de Colina	100.000 mg
Pantotenato de Cálcio	16.500 mg
Vitamina B6	1.200 mg
Vitamina B12	5 mg
Vitamina H	15 mg
Vitamina K3	500 mg
L-Carnitina	30.000 mg
Nicotinamida	2.500 mg
Sorbitol	50.000 mg
Excipiente q.b.p.	

"POOL" DE AMINOÁCIDOS

Lisina (6390 mg); Histidina (1700 mg); Arginina (4400 mg); Ácido Aspártico (9343 mg); Treonina (4300 mg); Serina (5400 mg); Ácido Glutâmico (12600 mg); Prolina (4100 mg); Glicina (4600 mg); Alanina (5300 mg); Cistina (1200 mg); Metionina (9500 mg); Valina (5800 mg); Isoleucina (3800 mg); Leucina (6400 mg); Tirosina (2500 mg); Fenilalanina (3900 mg).

INDICAÇÕES

Destinado à suplementação vitamínica, aminoácidos e proteína.
Para promover um crescimento são e vigoroso e um desenvolvimento mais rápido e equilibrado.
Para aumentar a postura no início, durante e após muda de pena.
Nas situações de stress, após desparasitações, etc.
Para melhorar o índice de conversão.
Para melhorar o índice de fertilidade e incubabilidade nas reprodutoras.
Para recuperação após enfermidades infecciosas ou parasitárias.

DOSAGENS

1 a 2 ml por litro de água bebida durante 10 a 15 dias.

APRESENTAÇÃO

50 ml e 100 ml

SUPLEMENTOS

VITADEC+K

Alimento complementar pó solúvel

COMPOSIÇÃO POR KG

Vitamina A	**25 000 000 UI**
Vitamina D3	**3 000 000 UI**
Vitamina E	**10 000 mg**
Vitamina C	**28 500 mg**
Vitamina K	**2 500 mg**
Excipiente q.b.p.	**1 000 g**

INDICAÇÕES

Indicado para todas as situações de stress, prevenção dos estados carenciais de vitamina A, D3 e E, após desparasitações, uso de antibióticos, após a muda da pena, recuperação das doenças, época da reprodução, na alimentação das crias, etc.

MODO DE EMPREGO

2 g por litro de água de beber, durante 5 a 7 dias nas situações indicadas.

APRESENTAÇÃO

100 g e 1 kg

AD3EC+K ZOOPAN®

Alimento Complementar

COMPOSIÇÃO POR LT

Vitamina A	**50 000 000 UI**
Vitamina D3	**10 000 000 UI**
Vitamina E	**10 000 UI**
Vitamina C	**75 g**
Vitamina K	**5 g**
Excipiente q.b.p.	**1 000 ml**

INDICAÇÕES

Indicado para todas as situações de stress, prevenção dos estados carenciais de vitamina A, D3 e E, após desparasitações, uso de antibióticos, após a muda da pena, recuperação das doenças, época da reprodução, na alimentação das crias, etc.

DOSES DE UTILIZAÇÃO E MODO DE EMPREGO

Aves canoras e pombos-correio: 1ml/Lt de água de bebida.
Pintos, aves de capoeira e coelhos: 0,5ml/Lt de água de bebida.
Suínos e equinos: 0,5ml/Lt de água de bebida.
Ruminantes e suínos: 1ml/Lt de água de bebida
Duração: 5 a 10 dias, contínuos ou alternados

APRESENTAÇÃO

100 g e 1 kg

PRO-HEPATIC

ADITIVOS POR LITRO

Metionina	**5 g**
Lisina	**12 g**
Colina	**60 g**
Niacina	**50 g**
Vitamina E	**50 g**
Vitamina B12	**20 mg**
Sorbitol	**100 g**
Excipiente q.b.p.	**1 000 ml**

- A Metionina é um protector hepático. Tem uma acção protectora da célula hepática sobrecarregada pela mobilização excessiva das gorduras corporais. É indispensável à formação da colina e da creatina.
- A Colina é um factor lipotrópico que impede a sobrecarga da gordura no fígado provocada por excesso de oleaginosas.
- O Sorbitol estimula as funções excreto-biliares permitindo uma desintoxicação do fígado e também uma melhor digestão dos lípidos e do alimento em geral.
- A Vitamina E além de ter uma importante acção na fisiologia sexual, de ser um antioxidante que participa na estabilização das gorduras insaturadas, de proteger a vitamina A, impede ainda a degenerescência muscular e a necrose hepática.
- A Niacina joga um papel importante no aproveitamento da energia.

PRO-HEPATIC contém portanto as principais substâncias que melhor previnem a intoxicação hepática e promovem a desintoxicação do fígado.
PRO-HEPATIC deve ser administrado logo após as provas, após o uso prolongado de antibióticos e na intoxicação hepática.

DOSAGENS:

1 a 2 ml por litro de água bebida por dia, e se possível, prosseguir o tratamento durante 5 dias seguidos. As doses podem ser aumentadas para o dobro se necessário.

APRESENTAÇÃO

50 e 100 ml

SUPLEMENTOS

VITAMINA E + SELÉNIO

COMPOSIÇÃO

Vitamina E	**100 000 mg**
Selénio (selenito de sódio)	**150 mg**
Excipiente q.b.p.	**1 000 ml**

Outros ingredientes: Sorbitol; ricinoelato de gliceril polietilenoglicol; sorbato de potássio; fosfato de sódio; ácido cítrico.

ESPÉCIES DE DESTINO
Aves canoras, ornamentais, pombos-correio e outros pets.

INDICAÇÕES
Prevenção das situações devidas a carências de Vitamina E e, ou, Selénio, que se traduzem nas aves por diversos distúrbios digestivos e patológicos, que se reflectem na produção, fertilidade e saúde em geral.
Indicado como coadjuvante na desintoxica-ção do organismo.

DOSAGENS
Para eliminar as deficiências em vitamina E e para desintoxicação: 1 ml por Lt. de água de bebida durante 5 dias.

Para melhoria da fertilidade durante o acasalamento: 1 a 2 ml por litro de água bebida durante 5 a 10 dias. Não associar produtos que contenham Vitamina E e Sélenio para evitar doses excessivas que poderão provocar toxicidade.

APRESENTAÇÃO
100 ml ; 1, 5 and 25 L,

AVISSTRESS®

COMPOSIÇÃO POR KG

L-carnitina	**30 g**
Vitamina A	**5.000.000 UI**
Vitamina D3	**1.000.000 UI**
Vitamina E	**500 mg**
Vitamina B1	**200 mg**
Vitamina B2	**100 mg**
Vitamina B6	**100 mg**
Niacina	**255 mg**
Pantotenato de cálcio	**1.200 mg**
Vitamina K3	**1,5 g**
Vitamina B12	**10 mg**
Excipiente q.b.p.	

INDICAÇÕES
Compensação da mal-absorção.
Está indicado nas situações de stress (fadiga, mudança de local, corte de bico, muda de pena, após vacinações, após desparasitações, alterações bruscas de temperatura, calor excessivo).

DOSAGENS
Na água: 2,5 a 5 g por litro de água.

APRESENTAÇÃO
100 g e 1 kg

BIO-SAC

BIO-SAC WS
Alimento complementar solúvel na água.

COMPOSIÇÃO POR KG
(1000 x 109 UFC) de Enterococcus faecium

BIO-SAC PÓ
Alimento complementar em pó para misturar no alimento.

COMPOSIÇÃO POR KG
(2000 x 107 UFC) de Enterococcus faecium

BIO-SAC MAXIMUS *(NOVO)*
Alimento complementar em pó para misturar no alimento

COMPOSIÇÃO POR KG
(2000 x 107 UFC) de Enterococcus faecium; Mananoligassacáridos; Beta-glucanos e Pré-bióticos.

BIO-SAC é dos produtos mais importantes e mais imprescindíveis para as aves. As aves, à custa do uso sistemático de antibióticos e de serem submetidas a constantes situações de forte stress, estão, com muita frequência, com a flora intestinal alterada, destruída ou depauperada.

O BIO-SAC repõe a flora intestinal e promove o seu desenvolvimento.
A flora intestinal é o conjunto de microorganismos (bactérias) que povoam o tubo digestivo e tem grande importância em todos os seres vivos, pois, além de outras funções importantes, dela depende a digestão dos alimentos, a síntese de vitaminas e outros nutrientes indispensáveis e são uma importante defesa contra a invasão das bactérias patogénicas. Todos os cientistas concordam que a flora intestinal influi, directa ou indirectamente, no estado de saúde dos animais através das seguintes funções:

- Produção de vitaminas e de ácidos gordos de cadeia curta.
- Degradação de substâncias alimentares não digeridas e melhor aproveitamento do alimento.
- Integridade do epitélio intestinal.
- Estímulo da resposta imunitária aumentando a resistência contra as doenças.
- Protecção contra os microorganismos enteropatogénicos prevenindo as colbaciloses e salmoneloses, frequentes em ornitofilia.

QUANDO ADMINISTRAR
Todas as épocas da vida são óptimas para o uso do BIO-SAC, especialmente durante a «amamentação» das crias (para prevenir a mortalidade e promover um melhor desenvolvimento), após o uso de antibióticos, desparasitações, vacinações e situações em geral.

SEGURANÇA NO USO
É absolutamente seguro e não tem qualquer contra-indicação ou efeitos colaterais sendo compatível com qualquer produto ou alimento.

DOSES E MODO DE EMPREGO

- BIO-SAC pó (não solúvel) - Humedecer o alimento com DEXTRO-PROPIL, espalhando de seguida uma colher de sopa de BIO-SAC pó por cada kg e misturar.
- BIO-SAC WS (solúvel) – Dissolver na água para beber, à razão de uma colher de chá por litro. Pode ser também misturado no alimento.
- BIO-SAC MAXIMUS - Humedecer o alimento com DEXTRO-PROPIL, espalhando de seguida uma colher de sopa de BIO-SAC MAXIMUS por cada kg e misturar.

APRESENTAÇÃO
100 g e 1 kg.

SUPLEMENTOS

FOSCAVIT ORNI

COMPOSIÇÃO POR KG

Teores Analíticos	
Cálcio	**28 %**
Fósforo	**3,6 %**
Sódio	**5,3 %**
Magnésio	**2,4 %**
Cloro	**9,7 %**
Cinzas Totais	**84 %**
Vitaminas / kg	
Vitamina A	**500.000 U.I.**
Vitamina D3	**100.000 U.I.**
Vitamina E (alpha-tocopherol)	**600 mg**
Vitamina B2	**600 mg**
Vitamina B 12.	**1.500 µg**
Niacina	**500 mg**
Oligoelementos / kg	
Ferro	**6.300 mg**
Manganês	**2.000 mg**
Cobre	**375 mg**
Selénio	**10 mg**
Zinco	**2.500 mg**
Iodo	**70 mg**
Cobalto	**25 mg**

INDICAÇÕES

Suplemento vitamínico e mineral para as aves em situações de depauperamento orgânico e para o fortalecimento de animais debilitados por situações de stress e esforço. Essencial no crescimento para fortalecer a estrutura óssea e promover um crescimento mais rápido. Durante a postura evita a fragilidade da casca do ovo, evita situações de stress, favorece a incubação e previne a descalcificação óssea.

DOSAGENS

10 g (1 colher de chá cheia) por kg de alimento durante 10 a 15 dias sempre que necessário. Pode ser também administrado num recipiente à parte onde as aves irão suplementar-se conforme as necessidades.

APRESENTAÇÃO

100 g e 1 Kg

ALIPROCT

COMPOSIÇÃO

Propionato de cálcio **75 %**

INDICAÇÕES

O ácido propiónico (propionato de cálcio) e os seus sais têm sido referidos como indispensáveis e amplamente usados na prevenção do desenvolvimento de fungos em todo o tipo de alimentos.
Com a suplementação do ácido propiónico nas quantidades suficientes obtêm-se os seguintes efeitos:
• Não há perda de nutrients;
• Não há formação de micotoxinas.
• Reduz no animal a sobrecarga de elevado número de germes e com ele o efeito profilático contra diarreias induzidas por bactérias e fungos.

DOSES E MODO DE EMPREGO

Preparação das sementes germinadas: 1 colher de chá bem cheia de ALIPROCT por cada kg de sementes, dissolvido na água a usar na germinação.
Papas e outros alimentos: 1 colher de chá rasa de ALIPROCT dissolvida num pouco de água quente, que servirá para humedecer o alimento, ou simplesmente misturado no alimento.

APRESENTAÇÃO

50 g, 100 g e 1 Kg

DEXTRO-PROPIL

Molhante energético

COMPOSIÇÃO POR KG

Energia Metabolizável (EM)	**23,9 MJ/kg**
1,2 -propanidiol	**100%**

MODO DE UTILIZAÇÃO

Juntar ao alimento seco pequenas quantidades até humedecer o suficiente para que as partículas em pó a misturar adiram ao alimento.

INDICAÇÕES

A fórmula do DEXTRO-PROPIL foi estudada para permitir que se consiga juntar ao alimento (grãos, granulados, farinados) os produtos e aditivos em pó conseguindo uma mistura homogénea que de outro modo não conseguiria. Pode usar também, somente como suplemento energético, misturando em cada kg de alimento, 1 ou 2 colheres de sopa cheias de DEXTRO-PROPIL.

APRESENTAÇÃO

100 ml e 1 L

SUPLEMENTOS

REHIDRAL

COMPOSIÇÃO

Cloreto de potássio	**30 g**
Cloreto de magnésio	**100 g**
Citrato de sódio	**30 g**
Bicarbonato de sódio	**35 g**
Cloreto de sódio	**60 g**
Excipiente q.b.p.	**1000 ml**

INDICAÇÕES
Importante para restabelecer o equilíbrio hídrico e electrolítico nas situações de desidratação e épocas quentes. É um importante coadjuvante de acção dos antibióticos no tratamento diarreias.

DOSAGENS
1 a 2 ml por litro de água de bebida, durante 3 a 7 dias.

APRESENTAÇÃO
50 ml e 100 ml

VIROCID®

ACM nº 1/2007/DGV

Desinfectante bactericida, virucida e fungicida.

SUBSTÂNCIAS ACTIVAS
Composto à base cloreto de alquildimetilbenzilamónio (17,06%), cloreto de didecilmetilamónio (7,8%), isopropanol (14,63%), glutaraldeído (10,73%)

CARACTERÍSTICAS
pH (1%): 5,9
Densidade (20ºC): 1 005 Kg/L
Ponto de congelação: - 10 ºC

INTERESSE TÉCNICO
VIROCID® tem as seguintes vantagens: Amigo do ambiente, desinfectante de nível hospitalar; Eficácia provada contra bactérias (gram(+) e gram(-) e esporuladas), vírus (encapsulados e não encapsulados) e fungos; Acção residual; Sem resistências conhecidas; Taxa de diluição baixa; Muito económico em utilização; Uso versátil: pulverização, nebulização, pedilúvios, rodilúvios; Fórmula sem metais pesados; Eficaz a qualquer temperatura ambiente (mesmo perto do ponto de congelação); Eficaz em águas duras (mesmo com água do mar) e numa vasta gama de pH; Não corrosivo para os equipamentos (pH neutro); Não é cancerígeno para as pessoas, não tóxico para os animais e meio ambiente. Após correcta limpeza das superfícies, desinfectar.

DOSAGENS
0.5% (5 ml de VIROCID® por litro de água).

MODO DE UTILIZAÇÃO
Por pulverização, por nebulização espumosa ou por baixa pressão.

APRESENTAÇÃO
1 Lt

AGROCID SUPER

Acidificante para a água de bebida.

COMPOSIÇÃO POR KG
Propionato de cálcio

INDICAÇÕES
Mistura de ácidos orgânicos.
Ácido láctico < 5%
Ácido fórmico > 50 %
Ácido propiónico > 10 %

INTERESSE TÉCNICO
AGROCID diminui o pH da água de bebida e tubo digestivo. Ao diminuir do pH dificulta o desenvolvimento da flora patogénica, o que contribui fortemente para a diminuição das diarreias e para a melhoria da digestão e absorção do alimento. Diminuindo o número de diarreias diminui a humidade das camas e baixa a concentração de NH3 o que melhora o ambiente e diminui os problemas respiratórios.
Dissolve os depósitos orgânicos dos bebedouros e canalizações. Descalcifica todo circuito de água e desinfecta a água.

DOSAGENS E MODO DE EMPREGO
Usar 15 a 20 ml ou 50 ml em caso de diarreias por cada 100 litros de água.

APRESENTAÇÃO
1 Lt

ZOOPAN®
SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL

PRODUTOS NATURAIS

OPTI-RESP PRO BIOS®

COMPOSIÇÃO
1,2 propanodiol
Sorbitol
Cloreto de sódio, Cloreto de potássio
Extractos de plantas

ADITIVOS SENSORIAIS E AROMATIZANTES / SABORIZANTES
Extractos de Glycyrrhiza glabra (ácido glicirrízico), Lonicra japónica e Cynara scolimus

INDICAÇÕES
Contribui para a diminuição da utilização de antibióticos habitualmente utilizados nos problemas respiratórios. Actua no reforço das defesas orgânicas, minimiza os sintomas provocados por problemas do tracto respiratório durante situações de stress e alterações climáticas, tais como asma, tosse, dificuldade respiratória, inflamação das vias respiratórias superiores.

DOSAGEM
- Aves em geral: misturar 1 a 2 ml, no máximo, por litro de água, de forma continua durante 3 a 5 dias consecutivos.
- Nas aves corpulentas (2 a 3 kg de peso vivo) pode administrar 0,5 ml, uma ou duas vezes ao dia com uma pipeta ou seringa, directamente no bico durante 3 a 5 dias seguidos.

APRESENTAÇÃO
50 e 100 ml

OPTI-TYLOS PRO BIOS®

COMPOSIÇÃO
1, 2 propanodiol
Sorbitol
Cloreto de sódio, Cloreto de potássio
Extractos de plantas

ADITIVOS SENSORIAIS E AROMATIZANTES / SABORIZANTES
Óleos essenciais / funcionais (Lonicra japónica) e outros extractos de plantas.

INDICAÇÕES
Inúmeros estudos e experiências publicadas referem que os óleos essenciais de Lonicera japónica glabra são os que melhor contribuem para a diminuição da utilização de antibióticos habitualmente usados nos problemas respiratórios. Além de actuarem no reforço das defesas orgânicas, minimizam os sintomas provocados por problemas do tracto respiratório durante situações de stress e alterações climáticas, tais como asma, tosse, dificuldade respiratória, inflamação das vias respiratórias superiores.

DOSAGEM
- Aves em geral: misturar 2 a 4 ml, no máximo, por litro de água, de forma continua durante 3 a 5 dias consecutivos.
- Nas aves corpulentas (2 a 3 kg de peso vivo) pode instilar 0,5 ml, uma ou duas vezes ao dia, com uma pipeta ou seringa, directamente no bico durante 3 a 5 dias seguidos.

APRESENTAÇÃO
50 e 100 ml

PRODUTOS NATURAIS

CARVACTIME PRO-BIOS®

COMPOSIÇÃO
1, 2 propanodiol
Sorbitol
Cloreto de sódio, Cloreto de potássio
Extractos de plantas

ADITIVOS SENSORIAIS E AROMATIZANTES / SABORIZANTES
Óleos essenciais de Origanum vulgaris e Thymus vulgaris

INDICAÇÕES
Inúmeros estudos e experiências publicadas referem que os óleos essenciais de carvacol e timol são os que melhor respondem no equilíbrio da flora intestinal e preservação da saúde animal, na melhoria da eficácia alimentar e na diminuição de necessidade de utilização de antibióticos ainda utilizados como aditivos. Estes óleos essenciais tem sido utilizados profusamente na indústria avícola e suinícola, com resultados que ultrapassam os conseguidos por modernos promotores de crescimento e reguladores do ecossistema digestivo, e na manutenção da saúde geral das aves e outros animais, nomeadamente na diminuição dos germens patogénicos no intestino.
Os benefícios gerais do Carvactyme são:
- Produto natural, seguro e fácil de usar.
- Reforça as defesas do organismo contra as enfermidades mais comuns.
- Minimiza as consequências do stress.
- Diminui os problemas intestinais e a necessidade de medicamentos para a prevenção de diarreias.
- Estimula a produção de ovos e ovos mais saudáveis.
- Melhora a saúde geral das aves.
- É completamente livre de resíduos químicos na carne e ovos.
- É compatível com todos os produtos e tratamentos.
- Diminui a necessidade de utilização de medicamentos na cura ou prevenção de enfermidades.
- Melhora a ingestão, apetência e conversão alimentar.
- Menor mortalidade nas aves e melhoria geral nos aspectos relacionados com a saúde dos animais.

Devido às conhecidas propriedades anti bacterianas, vírus e fungos, o Carvactyme mantém mais tempo os bebedouros descontaminados e a água mais saudável.

DOSAGEM
- Administrar 1 ml por litro de água bebida durante os períodos mais críticos (nas primeiras semanas de vida, em situações de stress, no transporte prolongado, aquando da presença em exposições / feiras, nas mudanças bruscas de temperatura, na, etc.) mudança de local.
- Problemas intestinais: 2 a 3 ml por litro de água potável, durante 5 a 10 dias.

APRESENTAÇÃO
50 e 100 ml

OPTI-COCCID PRO BIOS®

COMPOSIÇÃO
Extractos de plantas armáticas e saborizantes

ADITIVOS SENSORIAIS E AROMATIZANTES / SABORIZANTES
Extractos de Artemisia annua, Polygonum multiflorum, Pulsatilla, Cinnamomum, Carvacrol e Timol

INDICAÇÕES
Sobre estes extractos de plantas existem múltiplos dados publicados sobre experiências que nos revelam a sua capacidade de proporcionar um meio ambiente estável capaz de neutralizar o desenvolvimento de agentes causadores de coccidiose e outros problemas intestinais, além de outros benefícios relacionados com a manutenção da saúde dos animais:
- Sendo administrado de forma continua, substitui os aditivos antibióticos ou outros actualmente utilizados para prevenir as coccidioses ou como promotores do crescimento.
- Não tem intervalo de segurança, uma vez que não deixa qualquer resíduo nocivo na carne ou ovos.

DOSAGEM
- Aves em geral e outros animais: misturar 2 a 3 ml por litro de água de beber, de forma continua, como preventivo. Noutras situações, utilizar a dose de 5 ml por litro de água, durante 5 dias seguidos.
- Pode misturar no alimento (por kg) duplicando as doses indicadas por litro de água. Neste caso, o produto deverá ser muito bem misturado , utilizando luvas adequadas.
- Caso queira usar em simultâneo na água e no alimento, diminua para metade as doses indicadas para cada elemento.

APRESENTAÇÃO
50 e 100 ml

PRODUTOS NATURAIS

OPTI-PARASITAS PRO BIOS®

COMPOSIÇÃO
Extractos de plantas aromáticas e sensoriais: Dryopteris crassirhizoma, Radix polygoni multiflori

INDICAÇÕES
Existem múltiplos dados de experiências e estudos comparativos publicados sobre a capacidade que estes extractos de plantas (Dryopteris crassirhizoma, Radix polygoni multiflori tem para criar condições no tracto digestivo capazes de inibir ou neutralizar o desenvolvimento da maior parte dos parasitas intestinais. Para além destas características, tem as seguintes particularidades:
- Estimulam o apetite
- Aumenta a digestibilidade do alimento, melhorando o crescimento e engorda.
- Não tem intervalo de segurança, uma vez que não deixa qualquer resíduo nocivo na carne ou os ovos

DOSAGEM
- Aves: 1,5 a 3 ml por litro de água de bebida ou 3 a 5 ml por kg de alimento, durante 3 dias consecutivos.
- Outras espécies: 2 a 4 ml por litro de água de bebida ou 4 a 8 ml por kg de alimento, durante 3 dias consecutivos.

APRESENTAÇÃO
50 e 100 ml

OPTI-MUDA PROBIOS WS®

COMPOSIÇÃO
Dextrose
Extractos de plantas
Aditivos nutritivos e tecnológicos

ADITIVOS
Metionina + Cistina, Lisina, Biotina, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina C , Vitamina E, Zinco, Cobre, Cynara cardunculus

INDICAÇÕES
Produto de excelência destinado à preparação para a muda, à fase de muda , pós-muda e manutenção da plumagem

PROPRIEDADES
Produto composto por um «pool» de importantes aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais que, associados aos aminoácidos sulfurosos que são a base indispensável para a formação e boa textura as penas, proporcionam uma plumagem de qualidade excepcional. A presença de extractos de Cynara, vitamina C e vitamina E, que são os ingredientes que melhor actuam no sistema imunitário, metabólico e funções hepáticas, vai diminuir o desenvolvimento de enfermidades que iriam atrasar e diminuir a qualidade da plumagem.

DOSAGEM
Na água: 5 g (equivalente a 2 colheres medida ou de chá rasas) por litro de água de bebida.
Na papa: 7,5 g (equivalente a 3 colheres medida ou de chá rasas) por kg de papa.
Administrar, no mínimo, uma semana antes do período da muda. Não suspender até ao final da muda e dos concursos para as aves que neles participam.

APRESENTAÇÃO
50 e 100 g

OPTI-CANTO PRO BIOS WS®

COMPOSIÇÃO
Ácidos gordos
Sorbitol
Extractos de plantas
Aditivos nutritivos e tecnológicos

ADITIVOS
DL-Metionina, Vitamina A, Vitamina D3, alfa-tocoferol acetato, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina C, Cyneol, Sorbitol.

INDICAÇÕES
Ideal para tudo o tipo de aves de canto. Estimula e fortalece o canto das aves. As aves mais jovens iniciam mais cedo o canto e o seu desenvolvimento. Melhora ainda o desenvolvimento das penas durante o inicio do crescimento das crias até à total formação da plumagem.

DOSAGEM
Diluir 1 ml em cada litro de água (ou 5 a 6 gotas num bebedouro de 40 a 50 ml). Preparar a diluição a cada 24 horas.

APRESENTAÇÃO
50 e 100 ml

PRODUTOS NATURAIS

COLOR AVIS RED®

COMPOSIÇÃO
Cantaxantinas puras
β-caroteno

ESPÉCIE DE DESTINO
Especialmente indicado para canários e outras aves com factor vermelho intensivo

INDICAÇÕES
Produto convenientemente formulado com carotenóides puros (cantaxantina, β-caroteno e outros carotenóides) extraídos essencialmente de espécies de plantas seleccionadas.
Além de proporcionar uma cor brilhante, luminosidade e beleza das penas proporciona os seguintes e grandes benefícios às aves:
- Aumenta a resposta imunitária ou maior resistência às doenças infecciosas e situações de stress.
- Tem uma forte acção anti-oxidante reforçada pelo sinergismo entre os diversos componentes, o que melhora a saúde e a vivacidade das aves.

DOSAGEM
No alimento seco: adicionar 1 grama de COLOR AVIS RED® por kg de papa, misturando bem para obter uma boa homogeneidade.
Dissolvida na água: adicionar 14 gramas de COLOR AVIS RED® num recipiente opaco (garrafa escura de litro ou outra) com cerca de 0,5 litros de agua bem quente, agitando bem durante 30 a 60 segundos. Deixar arrefecer a solução até à temperatura ambiente e juntar agua fria (0,5 litro) até completar o litro. Para uma garrafa escura de 750 ml serão cerca de 10,5 gramas de produto.
Misturar uma colher de sopa (15 ml) da solução obtida por 300 gramas de papa ou por 0,5 L de água de beber.

APRESENTAÇÃO
100 g

COLOR AVIS Y PROTECT®

COMPOSIÇÃO
Luteína
Beta-caroteno
Extractos de alcachofra
Metionina e biotina

ESPÉCIE DE DESTINO
Especialmente indicado para canários e outras aves com factor amarelo para promover uma coloração intensiva e brilhante.

INDICAÇÕES
Produto convenientemente formulado com carotenóides puros luteína (xanthophyll), β-caroteno e outros carotenóides, Cynara cardunculus, metionina e biotina.
Além de proporcionar uma cor brilhante, luminosidade e beleza das penas proporciona os seguintes e grandes benefícios às aves:
- Aumenta a resposta imunitária ou maior resistência às doenças infecciosas e situações de stress.
- Tem uma forte acção anti-oxidante reforçada pelo sinergismo entre os diversos componentes, o que melhora a saúde e a vivacidade das aves.
- Melhora a plumagem.
- Oferece uma acção melhorada da função hepática e metabólica da plumagem.

DOSAGEM
No alimento seco: adicionar 1 grama de COLOR AVIS-Y® por kg de papa, misturando bem para obter uma boa homogeneidade.
Dissolvida na água: adicionar 14 gramas de COLOR AVIS-Y® num recipiente opaco (garrafa escura de litro ou outra) com cerca de 0,5 litros de agua bem quente, agitando bem durante 30 a 60 segundos. Deixar arrefecer a solução até à temperatura ambiente e juntar agua fria (0,5 litro) até completar o litro. Para uma garrafa escura de 750 ml serão cerca de 10,5 gramas de produto.
Misturar uma colher de sopa (15 ml) da solução obtida por 300 gramas de papa ou por 0,5 L de água de beber.

APRESENTAÇÃO
100 g

ZOOPAN®
SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL

MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO

Não sujeitos a receita médico-veterinária

VERMIZOO® 50g/kg

Pó oral para administração na água de bebida.

AIM Nº477/01/12NFSVPT (02/05/2012)

CADA KG DE PÓ CONTÉM

Substância activa	Quantidade
Cloridrato de Levamisol	50 g (m/m)

ESPÉCIES ALVO

Aves canoras, pombos correio, coelhos anões, chinchilas, porquinhos da índia, hamsters (cricetos), gerbilos, murganhos e ratos.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS ESPECIFICANDO AS ESPÉCIES ALVO

Profilaxia e tratamento de infecções causadas por nemátodes gastrointestinais, tais como: Syphacia spp., Aspicularis spp., Trichuris muris, Nippostrongylus brasiliensis, Baylisascaris procyonis, Trichostrongylus spp., Toxocara canis, Ascaris spp., Capillaria spp., Ascaridia spp., Heterakis spp., Paraspidodera uncinata e Syngamus trachea.

POSOLOGIA E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO

Administração: oral, na água de bebida. Aves-canoras: na água de bebida: 1 a 2 g/litro, no alimento: 2 a 4 g/kg; Pombos-correios: 2 - 3 g/litro de água de bebida; Coelhos anões: 2 a 4 g/litro de água de beber ou por kg de ração; Pequenos roedores: 2 – 3 g/litro de água de bebida.

APRESENTAÇÃO

30, 50 e 100 g

Precauções especiais para a utilização em animais: Todos os animais devem ser tratados simultaneamente. Não administrar a outras espécies animais para além das indicadas. Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que manipula o medicamento veterinário: Embora raro, pode ocorrer uma dermatite por contacto nas pessoas hipersensiveis. O medicamento veterinário pode provocar irritação das vias respiratórias, dos olhos e da pele após a sua inalação ou contacto. O medicamento veterinário deve ser manipulado com cuidado para evitar o contacto com a pele e os olhos durante a sua dissolução na água, assim como durante a administração da água medicada aos animais, tendo em conta as seguintes recomendações: tomar as medidas apropriadas para evitar a disseminação do pó durante a sua diluição em água; evitar o contacto com a pele e no caso de exposição lavar com água e sabão; evitar o contacto com os olhos e no caso de exposição lavar imediatamente com água abundante; evitar a inalação, mas se ocorrer inalação acidental remover a vitima para uma zona bem ventilada; não fumar, comer ou beber quando manipula o medicamento veterinário. Se ocorrer ingestão acidental não induzir o vómito a menos que tal seja indicado por pessoal médico. Lavar abundantemente a boca. Consultar o médico e/ou Centro de Informação Antivenenos (CIAV) o mais rapidamente possível.

BRONCOLIS®

Solução oral para administração na água de bebida para aves canoras e pombos-correio.

AIM Nº438/01/12NFSVPT (02/05/201)

CADA LITRO CONTÉM

Substância activa	Quantidade
Cloridrato de bromexina	5 g (m/v)
Eucaliptol	40 g (m/v)

ESPÉCIES ALVO

Aves canoras (canários, pintassilgos, mandarins, roselas, cardialitos da venuzuela, chapins, pintarrocho, glosters, verdilhões, piscos, bicos-de-lacre, diamante gold, cardeal cinzento, lugres, dominós, tecelão, pardal de Java, bengalis da India, rouxinol do Japão, kackarikis, agapornis, arantiga mitrata, periquitos, caturras, papagaios, araras, etc.) e pombos-correio.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS ESPECIFICANDO AS ESPÉCIES ALVO

O medicamento veterinário está indicado no tratamento das doenças respiratórias tem uma acção anti-séptica das vias respiratórias, um efeito broncodilatador e é fluidificante do muco .
Pode ser usado em conjunto com antimicrobianos para o tratamento das doenças respiratórias onde existe alteração da função de transporte mucociliar e produção de muco viscoso. Os expectorantes estimulantes são usados com frequência para o tratamento da tosse associada com patologias brônquicas crónicas.

POSOLOGIA E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO

Aves canoras e pombos-correio: 1 a 2 ml por litro de água para bebida.
Duração do tratamento: 3 a 5 dias, como coadjuvante no tratamento com antibióticos nas infecções respiratórias.
Evitar a pulverização do medicamento veterinário sobre os olhos e bico dos animais. Não exceder a dose recomendada.

APRESENTAÇÃO

30, 50,100 e 200 ml

Precauções especiais para a utilização em animais: Não estão descritas. Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que manipula o medicamento veterinário: Embora raro, pode ocorrer uma dermatite por contacto nas pessoas hipersensiveis. O medicamento veterinário pode provocar irritação das vias respiratórias, dos olhos e da pele após a sua inalação ou contacto. O medicamento veterinário deve ser manipulado com cuidado para evitar o contacto com a pele e os olhos durante a sua dissolução na água, assim como durante a administração da água medicada aos animais, tendo em conta as seguintes recomendações; evitar o contacto com a pele e no caso de exposição lavar com água e sabão; evitar o contacto com os olhos e no caso de exposição lavar imediatamente com água abundante; não fumar, comer ou beber quando manipula o medicamento veterinário. Se ocorrer ingestão acidental não induzir o vómito a menos que tal seja indicado por pessoal médico. Lavar abundantemente a boca. Consultar o médico e/ou Centro de Informação Antivenenos (CIAV) o mais rapidamente possível.

MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO
Não sujeitos a receita médico-veterinária

ACARENE SPRAY

Solução, para pombos, papagaios e outros psitacideos, aves canoras e ornamentais e coelhos de companhia.

Nº437/01/12NFSVPT (02/05/2012)

CADA 100 G CONTÉM

Substância activa	Quantidade
Piperonil butóxido	0,700g (m/m)
dFenotrina	0,200g (m/m)
Excipientes	
Hidroxitulueno butilado (BHT)	0,010g (m/m)
p-hidroxibenzoato de metilo	0,0067g (m/m)
p-hidroxibenzoato de propilo	0,0033g (m/m)
Outros excipientes	q.b.p. 100g (m/m)

ESPÉCIES ALVO
Pombos, papagaios e outros psitacideos, aves canoras e ornamentais tais como, canários (Serinus canaria), pintassilgos africanos, cardinalitos (Carduelis cucullata), Seedeaters (Sporohila), agapornis (Agapornis roseicolli, Agapornis personatu, Agapornis fischeri, Agapornis lilianae, Agapornis nigrigenis, Agapornis canus, Agapornis canus ablectaneus, Agapornis canus canus e Agapornis tarantan), periquitos de colar (Psittacula krameri), periquito-australiano ou periquito comum (Melopsittacus undulatus), e coelhos de companhia.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS ESPECIFICANDO AS ESPÉCIES ALVO
Pombos, papagaios e outros psitacideos, aves canoras e ornamentais: Tratamento local da acariose deplumante, das várias acarioses da plumagem, a acariose causada pelo ácaro vermelho (Dermanyssus gallinae, passarinus, etc.) e da dermatose causada por ácaros como Cnemidocoptes pilae, C. columbae em aves de gaiola e de volteio.
Coelhos de companhia: profilaxia de infecções parasitárias causadas por ectoparasitas e tratamento das sarna das orelhas causada por Psoroptes cunicoli, infestação por Cheyletiella parasitovorax, Sarcoptes scabini, Demodex cunicoli e pulgas.

POSOLOGIA E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO
Agitar a embalagem antes de usar.
Pombos, papagaios e outros psitacideos, aves canoras e ornamentais: Colocar o spray nos animais a uma distância de 30 cm. Aplicar o produto apenas durante 3-5 segundos, de modo a evitar queixas devido ao excessivo arrefecimento por causa da rápida evaporação do propulsor e consequente risco de infecção respiratória. Repetir o tratamento 5 dias após a primeira aplicação, para evitar uma reinfestação. Para reduzir o risco de uma infestação em larga escala, é oportuno tratar a cada 30 dias, e reduzir para 15 dias nos períodos de infestação. No caso da acariose deplumante, é aconselhável queimar as penas caducas.
Coelhos de companhia: Aplicação tópica sobre o pêlo. Para um coelho de companhia comum peso médio de 1 kg é suficiente administrar 3 aplicações de 5 segundos cada. Recomenda-se que se administre o produto contra o pêlo (no sentido oposto ao do pêlo). Como profilaxia, recomenda-se a repetição da administração a cada 15-20 dias.
Evitar a pulverização do medicamento veterinário sobre os olhos, bico e/ou focinho dos animais. Não administrar uma dose superior à recomendada.

APRESENTAÇÃO
150 ml

Precauções especiais para a utilização em animais: Não usar em simultâneo com outros produtos anti-parasitários; Não administrar a animais produtores de alimentos para consumo humano. Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que manipula o medicamento veterinário: O medicamento veterinário deve ser manipulado com cuidado para evitar o contacto com a pele, os olhos e mucosas em geral (e em particular no caso de pessoas sensíveis: asmáticos, alérgicos, etc.), tendo em conta as seguintes recomendações: Utilizar equipamentos de protecção individual apropriados; Evitar o contacto com os olhos e no caso de exposição lavar imediatamente com água abundante; Evitar a inalação, mas se ocorrer inalação acidental remover a vitima para uma zona bem ventilada. Não fumar, comer ou beber quando manipula o medicamento veterinário. Se ocorrer ingestão acidental não induzir o vómito a menos que tal seja indicado por pessoal médico. Lavar abundantemente a boca. Consultar o médico e/ou Centro de Informação Antivenenos (CIAV) o mais rapidamente possível. Em caso de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível, mostrar a embalagem); não contaminar alimentos, bebidas e recipientes utilizados para alimentação com o produto. Após o uso, lavar as mãos com sabão e agua corrente. Recipiente pressurizado: utilizar em área ventilada. Não pulverizar sobre chamas e materiais incandescentes. Não furar ou queimar após o uso. Não expor a temperaturas superiores a 30ºC. O medicamento veterinário não deve ser utilizado por mulheres grávidas. Manter fora do alcance das crianças.

CANDIO ACAR

Solução cutânea para aves ornamentais e pombos-correio

Nº465/01/12NFSVPT (18/04//2012)

CADA 100 G CONTÉM

Substância activa	Quantidade
Rotenona	0,3000g (m/m)
d-Fenotrina	0,0380g (m/m)
Excipientes	
Óleo de pinho	25,3000g (m/m)
Dipropilenoglicol	26,8200g (m/m)
Dimetiléter	47,5400g (m/m)

ESPÉCIES ALVO
Aves ornamentais tais como, canários (Serinus canaria), pintassilgos africanos, cardinalitos (Carduelis cucullata), Seedeaters (Sporohila), agapornis (Agapornis roseicolli, Agapornis personatu, Agapornis fischeri, Agapornis lilianae, Agapornis nigrigenis, Agapornis canus, Agapornis canus ablectaneus, Agapornis canus canus e Agapornis tarantan), periquitos de colar (Psittacula krameri), periquito de colar (Psittacula krameri), e pombos-correio.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS ESPECIFICANDO AS ESPÉCIES ALVO
Tratamento local da acariose respiratória, causada por ácaros: Stenostoma tracheacolum e meddai, Rhinosyssus sternostomus que infestam as aves ornamentais e os pombos-correio.

POSOLOGIA E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO
Agitar a embalagem antes de usar.
Colocar o spray nos animais a uma distância de 30 cm, durante 3-5 segundos, de modo a evitar queixas devido ao excessivo arrefecimento por causa da rápida evaporação do propulsor e consequente risco de infecção respiratória. Aplicar o medicamento veterinário produto duas a três vezes ao dia, durante uma máximo de 10 dias, dependendo da gravidade da infecção e da recomendação do médico veterinário assistente.
Evitar a pulverização do medicamento veterinário sobre os olhos e bico dos animais. Não exceder a dose recomendada.

APRESENTAÇÃO
150 ml

Precauções especiais para a utilização em animais: Não usar simultaneamente com outros anti-parasitários; Não administrar a animais com extensas lesões na pele. Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que manipula o medicamento veterinário: O medicamento veterinário deve ser manipulado com cuidado para evitar o contacto com a pele, os olhos e mucosas em geral (e em particular no caso de pessoas sensíveis: asmáticos, alérgicos, etc.), tendo em conta as seguintes recomendações: Utilizar equipamentos de protecção individual apropriados; Evitar o contacto com os olhos e no caso de exposição lavar imediatamente com água abundante; Evitar a inalação, mas se ocorrer inalação acidental remover a vitima para uma zona bem ventilada. Não fumar, comer ou beber quando manipula o medicamento veterinário. Se ocorrer ingestão acidental não induzir o vómito a menos que tal seja indicado por pessoal médico. Lavar abundantemente a boca. Consultar o médico e/ou Centro de Informação Antivenenos (CIAV) o mais rapidamente possível. Em caso de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível, mostrar a embalagem). Não contaminar alimentos, bebidas e recipientes utilizado para alimentação com o produto. Após o uso, lavar as mãos com sabão e água corrente. Recipiente pressurizado: utilizar em área ventilada. Não pulverizar sobre chamas e materiais incandescentes. Não furar ou queimar mesmo após o uso. Não expor a temperatura superiores a 30ºC. O medicamento veterinário não deve ser utilizado por mulheres grávidas. Manter fora do alcance das crianças.

ACONSELHA-SE O DETENTOR DAS AVES A LER CUIDADOSAMENTE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA CAIXA, RÓTULO OU NO FOLHETO INFORMATIVO E, EM CASO DE DÚVIDA OU PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, A CONSULTAR O SEU MÉDICO VETERINÁRIO.

ZOOPAN®
SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL

MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO

Sujeitos a receita médico-veterinária

Toda a nossa conhecida gama de medicamentos veterinários continuam no mercado.

Por motivos legais, a publicidade de qualquer medicamento de uso veterinário sujeito a receita médico-veterinária não pode ser realizada neste tipo de catálogo, reservando-se a sua publicidade exclusivamente a médicos veterinários e outros profissionais de saúde animal.

Se verificar que as suas aves, após regresso das provas de exposição ou por outras situações de forte stress, apresentam sintomas de infecções respiratórias ou digestivas ou prostração maior do que o habitual, mesmo depois da utilização dos nossos produtos naturais indicados como preventivos, consulte o seu médico veterinário que lhe receitará o medicamento veterinário mais indicado para cada situação específica, provavelmente um dos nossos. Informamos igualmente que os medicamentos de uso veterinário sujeitos a receita médico-veterinária registados no mercado, passarão a exigir receita médico-veterinária.

Informamos ainda que todos os medicamentos de uso veterinário existentes no mercado só podem ser vendidos em estabelecimentos devidamente autorizados, tais como: PVMV (Postos de Venda de Medicamentos Veterinários) e Farmácias.



ZOOPAN
SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL

É IMPORTANTE SABER O QUE DÁ ÀS SUAS AVES

REGRA DE OURO NO USO DE PRODUTOS NA CURA OU PREVENSÃO DE DOENÇAS:

NUNCA USE PRODUTOS SEM COMPOSIÇÃO.

Quando junta um produto com outro sem saber a sua composição, arrisca-se a anular a eficácia dos dois pois, muitas vezes, as substâncias que os compõem são antagónicas, perdem a sua eficácia e aumentam a toxicidade. O fracasso de muitos produtos deve-se ao facto de muitos ornitólogos darem às aves no mesmo dia produtos que isoladamente tem uma acção positiva e que, indevidamente associados, perdem a eficácia devido a incompatibilidades farmacológicas ou químicas.

PROCURE A SEGURANÇA NA LEGALIDADE.

Só as empresas legalmente autorizadas podem fabricar e introduzir no mercado os chamados PUV's (Produtos de Uso Veterinário) e MUV's (Medicamentos de Uso Veterinário). Todos os fabricantes autorizados (com GMP) são obrigados por lei a seguir as boas práticas de fabrico e controlo da qualidade e a exibir no rótulo, entre outras indicações importantes, a respectiva composição previamente aprovada pela Direcção Geral de Alimentação e Veterinária e Comissão Europeia.

A ZOOPAN é uma das poucas empresas nacionais autorizadas a fabricar medicamentos de uso veterinário com GMP (controlo de qualidade). Todos os produtos da ZOOPAN exibem no rótulo a respectiva composição. A fórmula de cada um dos nossos produtos tem atrás de si uma longa experiência nacional e internacional de eficácia quando usados para as situações em que estão indicados.

NO MERCADO NEGRO NUNCA LHE SERÁ GARANTIDA A QUALIDADE

Como encontrar os nossos produtos:

– Peça-os ao seu fornecedor habitual que os receberá nas 18 horas seguintes após a efectivação da encomenda.

– Ou, se não for possível, encomende-os directamente para:

ZOOPAN – Produtos Pecuários, SA
Rua da Liberdade, 77 - 2050-023 Aveiras de Baixo
Azambuja
T. +351 263 470 160
F. +351 263 470 169;
E. geral@zoopan.com
www.zoopan.com

ZOOPAN®
SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL

Rua da Liberdade, n.º 77
2050-023 Aveiras de Baixo
Portugal

Tel.: (+351) 263 470 160/162
Fax: (+351) 263 470 169
e-mail: geral@zoopan.com

www.zoopan.com